

W Y N I K I T E S T Ó W P Ł A T K O W Y C H S E R I A E P O K S Y D Y

Nazwisko:		<i>pieczętka placówki</i>
Data ur.:	Nr PESEL:	
Data rozp.:	Data zak.:	

Lp.	Nr kat.	Substancja testowa	48h	72h	96h	168h	1. CODEX*	2. CODEX*
1	H-003	Heksametylenotetraamina 2% waz.						
2	D-001	Diaminodifenylometan 0,5% waz.						
3	T-019	Trietylenotetramina 0,5% waz.						
4	P-023	Eter 2-fenyl-glicydylowy 0,25% waz.						
5	D-010	Dietylenotriamina 1% waz.						
6	I-006	Izoforonodiamina 0,1% waz.						
7	E-005	Dwuchlorowodorek etylenodwuaminy 1% waz.						
8	D-053	Dimetyloaminopropylamina 1% wod.						
9	B-035	Żywica epoksydowa, Bisfenol F 0,25% waz.						
10	H-026	Eter diglicydylowy 1,6-heksanodiolu 0,25% waz.						
11	B-036	Eter diglicydylowy 1,4-butanodiolu 0,25% waz.						
12	X-001	M-Ksylenodiamina 0,1% waz.						
13	T-038	Eter triglicydylowy trimetylopropanu 0,25% waz.						
14	T-048	2,4,6-Tri(dimetyloaminometylo)fenol 0,5% waz.						

W badaniach zastosowano materiały firmy Chemotechnique Diagnostics: www.chemotechnique.pl

Zapis wyników: „-” wynik ujemny, „+” słaby odczyn (rumień, naciek, ew. grudki), „++” silny odczyn (obecne pęcherzyki), „+++” odczyn skrajnie nasilony (pęcherze, nadżerki), „IR” odczyn podrażnieniowy, „NT” nie badano. *Ocena istotności klinicznej dodatniego wyniku wg systemu CODEX: patrz www.chemotechnique.pl/codex – Zaleca się przeprowadzenie pierwszej (wstępnej) obserwacji istotności na zakończenie testów, drugiej – na podstawie dalszej obserwacji klinicznej (czy unikanie danego haptenu przez pacjenta zaowocowało ustąpieniem choroby lub poprawą kliniczną).

Występowanie substancji: www.alergolog.eu

Uwagi:

pieczętka i podpis lekarza