

S E R I A I Z O C Y J A N I A N Ó W

Nazwisko:		<i>pieczętka placówki</i>
Data ur.:	Nr PESEL:	
Data rozp.:	Data zak.:	

Lp.	Nr kat.	Substancja testowa	48h	72h	96h	168h	1. CODEX*	2. CODEX*
1	T-009	Diizocyjanian 2,4-toluenu 2% waz.						
2	D-023	Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu 2% waz.						
3	D-001	Diaminodifenylometan 0,5% waz.						
4	I-007	Diizocyjanian izoforonu 1% waz.						
5	I-006	Izoforonodiamina 0,1% waz.						
6	H-022	Heksametylenodiizocyjanian 0,1% waz.						
7	P-038	Spolimeryzowany diizocyjanian difenylometanu (PMDI) 2%						

W badaniach zastosowano materiały firmy Chemotechnique Diagnostics: www.chemotechnique.pl

Zapis wyników: „-” wynik ujemny, „+” słaby odczyn (rumień, naciek, ew. grudki), „++” silny odczyn (obecne pęcherzyki), „+++” odczyn skrajnie nasilony (pęcherze, nadżerki), „IR” odczyn podrażnieniowy, „NT” nie badano. *Ocena istotności klinicznej dodatniego wyniku wg systemu CODEX: patrz www.chemotechnique.pl/codex – Zaleca się przeprowadzenie pierwszej (wstępnej) obserwacji istotności na zakończenie testów, drugiej – na podstawie dalszej obserwacji klinicznej (czy unikanie danego haptnu przez pacjenta zaowocowało ustąpieniem choroby lub poprawą kliniczną).

Występowanie substancji: www.alergolog.eu

Uwagi:

pieczętka i podpis lekarza